

# Απεικονιστικός έλεγχος μετά από ουρολοίμωξη: αλλαγές στην πρακτική της Αυστραλίας

Arch Dis Child 2009;94:927-931

South M

- Departments of General Medicine & Pediatrics, Murdoch Children's Research Institute, Royal Children's Hospital, Parkville, Victoria, Australia

Γ' Παιδιατρική Κλινική  
Ειδικευόμενη Τσολάκη Ειρηάνα

# Τί γνωρίζουμε ήδη για το θέμα

- Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων “ρουτίνας” ήταν αμφιλεγόμενος τα τελευταία 20 χρόνια
- Πρόσφατες μελέτες & κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν μία λιγότερο επιθετική προσέγγιση στη διερεύνηση

# Τί προκύπτει από τη μελέτη

- Την τελευταία 10ετία στην Αυστραλία γίνονται ολοένα και λιγότερες απεικονιστικές εξετάσεις μετά από ουρολοιμώξεις. Η κατακόρυφη πτώση του αριθμού των εξετάσεων είχε ως συνέπεια τον υποτριπλασιασμό του κόστους αυτών
- Αυτές οι αλλαγές έγιναν λίγο μετά τη δημοσίευση των νέων επιστημονικών δεδομένων που συστήνουν λιγότερες επεμβατικές μεθόδους ρουτίνας σε παιδιά με μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις
  - Κατευθυντήριες οδηγίες του National Institute for Health & Clinical Excellence (UK, 2007)
- Στο παρόν άρθρο προτείνεται –σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης- η καθιέρωση του υπερηχογραφήματος ουροποιητικού ως μέθοδος ρουτίνας σε παιδιά με μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις